

Boehringer Ingelheim	Revision	5	Type/Size	Carton / 50 Ds, 100 mL
	Operator	hal	Template #	842
	Date	26Feb13	Dimensions	3-15/16" x 2-1/16" x 4-1/4"
	Art #	158202-01	PDF	27Feb13 hal
	Item #	558200	RevLevel	01
	Product	Pyramid 3		

BLACK
BLACK - 70%
PMS 107
PMS 265
VARNISH

DIELINE: L071796E_C

Click here with mover tool to bring varnish plate to front



10-20281

Serial No.:
N° de lote:
Exp. Date:
Fecha de venc.:

50 Doses / Rehydrate to 100 mL

PYRAMID® 3



This package contains one 50 dose vial of MLV vaccine and one 100 mL vial of diluent.

Indications: For vaccination of healthy cattle as an aid in the prevention of disease caused by bovine rhinotracheitis virus and bovine virus diarrhea (types 1 and 2). This product aids in the prevention of persistent BVD type 1 and type 2 infection of the fetal calf when it is used subcutaneously in the cow or heifer 30 to 60 days pre-breeding. This vaccine may be used in pregnant cows or calves nursing pregnant cows provided the cows were vaccinated pre-breeding, according to label instructions. See insert for details.

Composition: Contains IBR and BVD types 1 and 2 modified live viruses, with Metastim® adjuvant, and neomycin, polymyxin B, and thimerosal as preservatives.

Dosage and administration: See insert.

Precautions: Store in the dark at 35 - 45°F (2 - 7°C). Avoid freezing. Use entire contents when first opened. A small percentage of animals may show transient mild injection site swelling. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Burn container and all unused contents. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine.

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
St. Joseph, MO 64506
US Vet. Lic. No. 124
Lic. Vet. de EE.UU. N° 124
Code 158-231



GLUE

Vacuna contra la Rinotraqueítis-Diarrea Viral de los Bovinos

Virus Vivo Modificado
PYRAMID® 3
Uso Veterinario
50 Dosis / Rehidratar a 100 mL

PYRAMID® 3



Este caja contiene un frasco de 50 dosis de vacuna VM y un frasco de 100 mL de diluyente.

Indicaciones: Para la vacunación de ganado bovino sano como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus de la rinotraqueítis bovina y la diarrea viral bovina (tipos 1 y 2). Este producto ayuda en la prevención de las infecciones persistentes de diarrea viral bovina tipo 1 y tipo 2 en el feto cuando se administra a vacas o vaquillas o vaquillonas por vía subcutánea entre los 30 y 60 días antes del servicio. Esta vacuna puede ser administrada a vacas gestantes o a becerros amamantados por vacas gestantes siempre y cuando las vacas hayan sido vacunadas antes del servicio, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Ver detalles en el prospecto.

Fórmula: Contiene virus vivos modificados de IBR y BVD tipos 1 y 2, con el adyuvante Metastim® y neomicina, polimixina B, y timerosal como agentes conservantes.

Dosis y administración: Ver el prospecto.

Precauciones: Almacenar en la oscuridad a 35 - 45°F (2 - 7°C). Evitar la congelación. Utilizar todo el contenido una vez abierto. Un porcentaje pequeño de los animales puede manifestar una tumefacción leve y transitoria en el sitio de la inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Incinerar el recipiente y todo el contenido no utilizado. En caso de reacción anafiláctica, administrar epinefrina.

Bovine Rhinotracheitis-Virus Diarrhea Vaccine

Modified Live Virus
PYRAMID® 3
For Veterinary Use Only
50 Doses / Rehydrate to 100 mL

PYRAMID® 3



Pyramid® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
Metastim® is a trademark of Wyeth LLC. Used under license.



158202-01