

Boehringer Ingelheim	Revision	9	Type/Size	10 Dose Carton
	Operator	Ish	Template #	841
	Date	15Feb13	Dimensions	3" x 1-9/16" x 2-7/8"
	Art #	158603-02	PDF	15Feb13 Ish
	Item #	558600	Rev Level	02
	Product	Pyramid 5	MASTER	

BLACK

BLACK - 70%

PMS 107

PMS 032

AQUEOUS COAT

DIELINE: M091002M_B



20-009851

Serial No.:
Nº de lote:
Exp. Date:
Fecha de venc.:

10 Doses / Rehydrate to 20 mL

PYRAMID® 5



Vacuna contra la Rinotraqueítis-Diarrea Viral-Parainfluenza 3-Virus Sincitial Respiratorio de los Bovinos

Virus Vivo Modificado
PYRAMID® 5
Uso Veterinario
10 Dosis / Rehidratar a 20 mL

PYRAMID® 5



Este caja contiene un frasco de 10 dosis de vacuna VVM y un frasco de 20 mL de diluyente.
Indicaciones: Para la vacunación de ganado bovino sano como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el virus de la rinotraqueítis bovina, la diarrea viral bovina (tipos 1 y 2), la parainfluenza 3 bovina y el virus sincitial respiratorio de los bovinos. Este producto ayuda en la prevención de las infecciones persistentes de diarrea viral bovina tipo 1 y tipo 2 en el feto cuando se administra a vacas o vaquillas o vaquillonas por vía subcutánea entre los 30 y 60 días antes del servicio. Esta vacuna puede ser administrada a vacas gestantes o a becerros amamantados por vacas gestantes siempre y cuando las vacas hayan sido vacunadas antes del servicio, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Ver detalles en el prospecto.
Fórmula: Contiene virus vivos modificados de IBR, BVD tipos 1 y 2, PI3 y BRSV con el adyuvante Metastim® y neomicina, polimixina B y timerosal como agentes conservantes.
Dosis y administración: Ver el prospecto.
Precauciones: Almacenar en la oscuridad a 35 - 45°F (2 - 7°C). Evitar la congelación. Utilizar todo el contenido una vez abierto. Un porcentaje pequeño de los animales puede manifestar una tumefacción leve y transitoria en el sitio de la inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Incinerar el recipiente y todo el contenido no utilizado. En caso de reacción anafiláctica, administrar epinefrina.

Bovine Rhinotracheitis-Virus Diarrhea-Parainfluenza 3-Respiratory Syncytial Virus Vaccine

Modified Live Virus
PYRAMID® 5
For Veterinary Use Only
10 Doses / Rehydrate to 20 mL

PYRAMID® 5



This package contains one 10 dose vial of MLV vaccine and one 20 mL vial of diluent.
Indications: For vaccination of healthy cattle as an aid in the prevention of disease caused by bovine rhinotracheitis virus, bovine virus diarrhea (types 1 and 2), bovine parainfluenza 3, and bovine respiratory syncytial virus. This product aids in the prevention of persistent BVD type 1 and type 2 infection of the fetal calf when it is used subcutaneously in the cow or heifer 30 to 60 days pre-breeding. This vaccine may be used in pregnant cows or calves nursing pregnant cows provided the cows were vaccinated pre-breeding, according to label instructions. See insert for details.
Composition: Contains IBR, BVD types 1 and 2, PI3, and BRSV modified live viruses, with Metastim® adjuvant, and neomycin, polymyxin B, and thimerosal as preservatives.
Dosage and administration: See insert.
Precautions: Store in the dark at 35 - 45°F (2 - 7°C). Avoid freezing. Use entire contents when first opened. A small percentage of animals may show transient mild injection site swelling. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Burn container and all unused contents. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine.
Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
St. Joseph, MO 64506
US Vet. Lic. No. 124
Lic. Vet. de EE.UU. N° 124
Code 158-611



Pyramid® is a registered trademark of Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. Metastim® is a trademark of Wyeth LLC. Used under license.



158603-02