










	Abnormal Milk / Leche Anormal	Abnormal quarter / Cuarto Anormal	Sick Cow / Vaca Enferma
Grade of Mastitis Grado de Mastitis			
1 Mild Leve			
	Action: 1. Take milk sample. 2. Record information Acción: 1. Tomar una muestra de leche. 2. Registrar el información.		
2 Moderate Moderado			
	Action: 1. Take milk sample. 2. Record information Acción: 1. Tomar una muestra de leche. 2. Registrar el información.		
3 Severe Grave			
	Action: 1. Treat her immediately. Acción: 1. Tratarla enseguida.		

Residue Warnings:

1. Milk that has been taken from animals during treatment and for 96 hours after the last treatment must not be used for food.
2. Treated animals must not be slaughtered for food until 4 days after the last treatment.
3. Administration of more than the prescribed dose may lead to residue of antibiotic in milk longer than 96 hours.

Advertencias Sobre Residuos:

1. La leche que se ha extraído de animales en la etapa de tratamiento y durante 96 horas después del último tratamiento no se debe utilizar para alimentos.
2. Los animales tratados no se deben faenar para alimento hasta 4 días después del último tratamiento.
3. La administración de una dosis mayor a la recetada puede dar lugar a residuos de antibióticos en la leche durante más de 96 horas.